

- come si presentano i due tipi diversi di psicosi infantile di cui parla nell'articolo: errore nella treccia al 2° incrocio o al 5°.
- che tipo di intervento è possibile quando il nodo è già costituito? Dunque con bambini più grandi, es. 7/8 anni?
- il caso di Matteo, 17 anni, sindrome di Asperger: si può parlare di autismo o di psicosi in un ragazzo che può interrogarsi sul significato della sua diagnosi, e quindi di cosa è veramente lui?
- si può parlare di autismo "da trauma"?
- che rapporto tra autismo e anoressia? es. il caso di A.Nathomb
- quale sarebbe l'intreccio di una diagnosi di Asperger?
- funzione della scrittura nel tenere insieme il nodo fatto male
- cosa vuol dire "funzionamento della funzione" ... non c'è un disfunzionamento solo, a secondo degli errori nell'intreccio
- che differenza c'è tra autismo e disabilità mentale? La disabilità sarebbe un errore di intreccio del Reale?
- il caso di Lorenzo, 7 anni, disturbo dello spettro autistico: alla madre è stato diagnosticato una sindrome di Asperger solo in seguito alla diagnosi del figlio. Come si può lavorare per "trasferire" sulla madre un transfert che sembra invece possibile con la psicologa che lo segue?
- come lavorare con i genitori e i fratelli di bambini autistici?
- quando un bambino nasce prematuro e vive x molto tempo in incubatrice; oppure la neomamma ha un periodo di babyblues, può esserci rischio d'autismo?